

# ***duspatalin***

Meveberina

## **COMPOSICION**

Cada gragea contiene: Hidrocloruro de mebeverina (DCI), 135 mg. Excipientes: Sacarosa, Lactosa monohidrato; Almidón de patata; Povidona; Talco; Estearato de magnesio; Goma arábiga; Gelatina y Cera éster montánica.

## **FARMACOLOGIA**

**duspatalin** es un antiespasmódico musculotrópico con acción directa sobre el músculo liso del tracto gastrointestinal, que alivia los espasmos sin afectar la motilidad normal del intestino. Dado que esta acción no está mediada por el sistema nervioso autónomo no se producen los clásicos efectos secundarios anticolinérgicos. **duspatalin** es un medicamento apropiado para pacientes con hipertrofia prostática y glaucoma.

El principio activo de **duspatalin**, mebeverina, se absorbe rápida y completamente después de la administración oral. Mebeverina no se excreta como tal, sino que se metaboliza dando ácido verátrico y alcohol mebeverínico, los cuales se eliminan en orina. La eliminación es total en 24 horas.

## **INDICACIONES**

Síndrome de colon irritable primario y otras patologías usualmente incluidas en este grupo como son: colon irritable crónico, estreñimiento espástico, colitis mucosa, colitis espástica. Mebeverina se usa eficazmente para tratar los síntomas de esta patología como son: dolores y calambres abdominales persistentes, diarrea no específica (con o sin estreñimiento alternante) y sensación de plenitud.

Tratamiento de espasmos gastrointestinales secundarios a enfermedades orgánicas (diverticulosis y diverticulitis). Enteritis.

## **POSOLOGIA**

1 gragea tres veces al día, 20 minutos antes de las comidas.

A menudo es necesario un mes o más de tratamiento debido al carácter crónico de las indicaciones para las que se recomienda **duspatalin**.

## **CONTRAINDICACIONES**

No se han descrito.

## **PRECAUCIONES**

Aunque los experimentos en animales no han mostrado efectos teratogénicos del fármaco, se observarán las precauciones usuales durante el embarazo.

## **ADVERTENCIAS**

Al carecer **duspatalin** de efectos secundarios de tipo atropínico puede ser administrado a enfermos con glaucoma o hipertrofia prostática.

A dosis terapéuticas, mebeverina no se excreta en la leche de mujeres lactantes.

A las dosis recomendadas **duspatalin** no afecta la capacidad de reacción necesaria para conducir o manejar maquinaria.

## **INCOMPATIBILIDADES**

No se han descrito.

## **EFFECTOS SECUNDARIOS**

No se han descrito.

## **INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO**

En caso de sobredosis o ingestión accidental, acuda inmediatamente a su médico, al hospital más próximo o llame al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 596.04.20.

Teóricamente, en casos de sobredosificación puede producirse excitabilidad del sistema nervioso central. Las medidas a seguir serán la suspensión del tratamiento, lavado gástrico y tratamiento sintomático.

## **CONDICIONES DE CONSERVACION**

**duspatalin** no precisa condiciones especiales de almacenamiento.

## **PRESENTACION**

Envase con 60 grageas.

## **CON RECETA MEDICA**

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE  
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

*Titular y fabricante:*

**SOLVAY PHARMA, S.A.**

Av. Diagonal, 507

08029 Barcelona

*Comercializado por:*

**DUPHAR NEZEL, S.L.**

Av. Diagonal, 507

08029 Barcelona